© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

# Incrocio Dalmasso XI/6

Carlomagno A., Ferrandino A., Ruffa P., Raimondi S., Novello V. (2014) - Incrocio Dalmasso XI/6. In: Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

**release** 13/07/2015, **ultimo aggiorn.** 13/07/2015 **url** http://vitisdb.it/accessions/show/15946

## Informazioni gestite da

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Università degli Studi di Torino

## Ringraziamenti

Ager IVD; Azienda Didattico – Sperimentale 'Tetti Grondana', Chieri (TO)

## Informazioni generali

**nome** Incrocio Dalmasso XI/6
**codice** ITA424-036
**nazione di selezione** Italia
**regione di selezione** Piemonte
**provincia di selezione** non disponibile
**località di selezione** non disponibile
**istituzione custode** Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Università degli Studi di Torino
**collezione** Azienda Agraria Didattico Sperimentale 'Tetti Grondana' - Chieri (TO)

## Varietà & clone

**tipo di origine** incrocio intraspecifico
**genere** Vitis
**specie** Vitis vinifera
**sub specie** sativa
**varietà** Incrocio Dalmasso XI/6
**codice della varietà** IVD-var_295
**clone** non disponibile
**trueness to type** accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

## Trueness to type

### *True-name*

| | |
|---|---|
| confermato | **si** |

### *Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)*

| | |
|---|---|
| accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) | **accertato** |

### *Trueness to type accertato con microsatelliti*

| | |
|---|---|
| accertamento con microsatelliti | **accertato** |
| loci confrontati | n.d. |
| loci identici | n.d. |
| discrepanze | n.d. |

## Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti ( 9 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| locus SSR: | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 133 | 149 | 225 | 231 | 249 | 249 | 179 | 185 | 186 | 188 | 251 | 255 | 250 | 250 | 239 | 261 | 259 | 273 |

## Immagini

**germoglio**

**foglia**

**foglia pagina superiore**

**foglia pagina inferiore**

**grappolo**

## Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|---|---|---|---|---|
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 3 | bassa | |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi | 1 | verde | |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi | 1 | verde | |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno | |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 1 / 3 | verde / bronzato | |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) | 3 | bassa | |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 4 | orbicolare | |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 3 | cinque | |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 1 / 2 | assente / solo al punto peziolare | |
| 075 | Foglia adulta: bollositá della pagina superiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 5 / 3 (⊘ 2) | misto tra entrambi i lati rettilinei (livello 2) e entrambi i lati convessi (livello 3) / entrambi i lati convessi | |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 3 / 7 | aperto / sovrapposto | |
| 080 | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare | 2 | a parentesi graffa ({) | |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare | 1 | assenti | |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata | |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superori | 1 | assenti | |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 7 / 3 | elevata / bassa | |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato | |
| 155 | Tralcio: fertilità delle gemme basali (gemme 1-3) | 1 | molto bassa (<0,5) | |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 7 / 5 | lungo / medio | |
| 204 | Grappolo: compattezza | 5 | medio | |
| 208 | Grappolo: forma | 3 | a imbuto | |
| 220 | Acino: lunghezza | 5 / 7 | medio / lungo | |
| 221 | Acino: larghezza | 5 | medio | |
| 223 | Acino: forma | 7 | ovoidale | |
| 225 | Acino: colore della buccia | 1 | verde giallo | |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 1 | nessuna | |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 3 | completo | |

### *Note ampelografiche*

La varietà è caratterizzata dalla presenza di viticci trifidi. La forma del lembo fogliare può essere orbicolare oppure orbicolare tendente al pentagonale. Il profilo del lembo appare piano con margini contorti o revoluti. Il seno peziolare può essere a parentesi graffa oppure a V+U.

*OIV*

nessun descrittore presente per Incrocio Dalmasso XI/6

*Superampelo*

| distanze | | |
|---|---|---|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Distanza tra estremità di N2 e estremità della prima ramificazione laterale di N2 | 27.060 | 6.094 |
| Distanza tra estremità di N2' e estremità della prima ramificazione laterale di N2' | 31.630 | 10.231 |
| Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro | 18.150 | 4.307 |
| Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro | 19.360 | 4.594 |
| Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro | 16.150 | 2.221 |
| Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro | 16.430 | 3.431 |
| Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4 | 5.740 | 1.198 |
| Nervatura N3', lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4' | 5.680 | 1.262 |
| Lunghezza della nervatura N5 | 8.910 | 1.775 |
| Lunghezza della nervatura N5' | 9.720 | 1.800 |
| Lunghezza della nervatura N4 | 21.650 | 3.074 |
| Lunghezza della nervatura N4' | 22.870 | 4.231 |
| Larghezza della foglia | 84.860 | 11.732 |
| Lunghezza della foglia | 83.540 | 8.797 |
| Lunghezza del picciolo | 47.870 | 8.428 |
| Lunghezza della foglia compreso il picciolo | 105.340 | 13.305 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2' | 83.690 | 11.821 |
| Lunghezza della nervatura N1 | 57.470 | 5.744 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4' | 20.760 | 3.865 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3' | 69.870 | 7.807 |
| Lunghezza della nervatura N2 | 51.500 | 5.900 |
| Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP' | -4.740 | 2.312 |
| Lunghezza della nervatura N3 | 36.300 | 4.789 |
| Lunghezza della nervatura N2' | 52.730 | 6.420 |
| Lunghezza della nervatura N3' | 38.900 | 5.551 |

| angoli | | |
|---|---|---|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 61.720 | 7.432 |
| Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 53.260 | 3.560 |
| Angolo tra N1 e N2' misurato alla prima biforcazione | 62.700 | 6.997 |
| Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3 | 59.000 | 7.478 |
| Angolo tra N2' e N3' misurato alla prima biforcazione | 54.260 | 5.058 |
| Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature | 51.590 | 7.544 |
| Angolo tra N3' e N4' | 59.590 | 7.790 |
| Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature | 58.290 | 3.592 |
| Angolo tra N1 e N2' misurato agli estremi delle nervature | 56.420 | 12.428 |
| Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature | 45.470 | 5.953 |
| Angolo tra N2' e N3' misurato agli estremi delle nervature | 53.470 | 8.401 |
| Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP' | 28.870 | 20.662 |
| Angolo tra N3' e N4' misurato agli estremi delle nervature | 47.460 | 6.010 |
| Angolo tra S e S' con centro in N1 | 24.870 | 6.782 |
| Angolo tra D e D' con centro in N1 | 105.340 | 12.185 |
| Angolo tra I e I' con centro in N1 | 34.430 | 7.803 |

| rapporti | | |
|---|---|---|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Media della base dei denti del lato sinistro | 4.691 | 0.787 |
| Media della base dei denti del lato destro | 4.750 | 0.848 |
| Media dell’altezza dei denti del lato sinistro | 3.193 | 0.586 |
| Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N4’ | 0.925 | 0.144 |
| Media dell’altezza dei denti del lato destro | 2.954 | 0.794 |
| Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia | 0.991 | 0.078 |
| Rapporto tra la somma degli angoli a’ + b’ e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS’ e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI’ | 0.059 | 0.015 |
| Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI | 0.060 | 0.010 |
| Rapporto tra l’altezza e la base dei denti del lato sinistro | 0.680 | 0.037 |
| Rapporto tra l’altezza e la base dei denti del lato destro | 0.615 | 0.125 |
| Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N2’ | 0.996 | 0.254 |
| Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N2 | 1.119 | 0.368 |
| Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N4 | 0.897 | 0.154 |