



Famoso

release 13/06/2015, ultimo aggiorn. 13/06/2015 url <http://vitisdb.it/accessions/show/3260>

Informazioni gestite da

Dipartimento di Scienze Agrarie - Università degli Studi di Bologna

Informazioni generali

nome Famoso
nazione di selezione Italia
provincia di selezione Ravenna
istituzione custode Dipartimento di Scienze Agrarie - Università degli Studi di Bologna
collezione Tebano
codice ITA052-FamoDCA1
regione di selezione Emilia-Romagna
località di selezione Bagnacavallo

Varietà & clone

tipo di origine spontanea
specie Vitis vinifera
varietà Famoso
clone non disponibile
trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)
genere Vitis
sub specie sativa
codice della varietà IVD-var_79

Trueness to type

True-name

confermato **si**

►bibliografia correlata (1)

| autori | anno | titolo | rivista | citazione |
|-------------|------|-------------|---------|--|
| Marzotto N. | 1925 | Uve da vino | | voll. I-II, Tipografia Commerciale, Vicenza. |

Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

►bibliografia correlata (1)

| autori | anno | titolo | rivista | citazione |
|-------------|------|-------------|---------|--|
| Marzotto N. | 1925 | Uve da vino | | Volume I. Tipografia commerciale, Vicenza. |

Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con microsatelliti **non accertato**

Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|----|----|----|----|
| | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | A1 | A2 | | |
| locus SSR: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 133 | 133 | 225 | 227 | 239 | 247 | 179 | 189 | 188 | 204 | 243 | 245 | 240 | 242 | 231 | 261 | | | | |

Immagini



germoglio



foglia



grappolo



acino



vinacciolo

Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|-------|--|-----------|----------------------------|---|
| | | | | |
| 001 | Giovane germoglio: apertura dell'apice | 5 | completamente aperto |  |
| 003 | Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice | 5 | media | |
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 5 | media | |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi | 1 | verde | |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi | 1 | verde | |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno | |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 1 | verde |  |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) | 5 | media | |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 2 | cuneiforme | |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 2 | tre | |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 1 | assente | |
| 074 | Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale | 1 | piano | |
| 075 | Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 2 | entrambi i lati rettilinei | |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 3 | aperto | |
| 080 | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare | 2 | a parentesi graffa ({}) | |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare | 1 | assenti | |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata | |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori | 1 | assenti | |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 3 | bassa | |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 5 / 7 | medio / lungo |  |
| 204 | Grappolo: compattezza | 3 / 4 (5) | spargolo / medio-spargolo | |
| 208 | Grappolo: forma | 2 | conico | |
| 209 | Grappolo: numero di ali del grappolo principale | 2 | 1 - 2 ali | |
| 220 | Acino: lunghezza | 5 | medio |  |
| 221 | Acino: larghezza | 5 | medio | |
| 223 | Acino: forma | 6 | troncovooidale | |
| 225 | Acino: colore della buccia | 1 | verde giallo | |
| 231 | Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa | 1 | nulla o molto debole | |
| 235 | Acino: consistenza della polpa | 2 | leggermente soda | |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 2 | aroma moscato | |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 3 | completo | |

Ampelometria

OIV

nessun descrittore presente per Famoso

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Famoso

Fenologia & produzione

| OIV | descrizione | valore | |
|-----|---|--------|-------------------------------------|
| 301 | Epoca di germogliamento | 5 | media |
| 302 | Epoca di fioritura | 5 | media |
| 303 | Epoca d'inizio dell'invaiaatura | 5 | medio |
| 304 | Epoca di maturazione fisiologica dell'acino | 4 | medio-precoce |
| 502 | Grappolo: peso di un grappolo | 3 | basso (250-350 g) |
| 503 | Acino: peso di un acino | 2 | tra molto basso e basso (1,5-2,5 g) |
| 504 | Peso dell' uva prodotta per m 2 | 3 | basso (1,0-1,2 kg) |
| 505 | Tenore in zucchero del mosto | 7 | elevato (20,2-21,8) |
| 506 | Acidità totale del mosto | 4 | medio-bassa (6,8-8,2) |
| 508 | pH del mosto | 5 | medio (3,2-3,3) |

Vegeto-produttivo

| sesto di impianto e forma di allevamento | valore | deviazione standard | numero di anni |
|--|-------------------|---------------------|----------------|
| Forma di allevamento | cordone speronato | | |
| Sistema di potatura | | | |
| Distanza sulla fila (m) | 1.000 | | |
| Distanza tra le file (m) | 2.800 | | |

| vigore | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|--------|---------------------|----------------|
| Numero germogli/tralci per metro di filare (numero/m) | | | |
| Numero germogli/tralci per pianta (numero/pianta) | | | |
| Peso legno di potatura per metro di filare (kg) | | | |
| Peso legno di potatura per pianta (kg) | | | |
| Peso medio tralcio (g) | | | |

| fertilità | valore | deviazione standard | numero di anni |
|--|--------|---------------------|----------------|
| Fertilità basale (grappoli/gemma) | 1.500 | | |
| Numero infiorescenze per germoglio alla fioritura (numero/germoglio) | 1.800 | | |

| quantità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---------|---------------------|----------------|
| Diametro acino (media di 25 acini) - larghezza (mm) | | | |
| Diametro acino (media di 25 acini) - lunghezza (mm) | | | |
| Numero grappoli per metro lineare (numero/m) | 12.000 | | |
| Numero grappoli per pianta (numero/pianta) | 2.900 | | |
| Peso di 100 acini (g) | 170.000 | | |
| Peso medio grappolo (g) | 250.000 | | |
| Produzione per ettaro (t/ha) | 10.000 | | |
| Produzione per metro di filare (kg/m) | 2.900 | | |
| Produzione per pianta (kg/ceppo) | 2.900 | | |

| qualità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| Acidità titolabile del mosto (g/l) | 6.800 | | |
| Antociani nella polpa? (si/no) | <input type="checkbox"/> no | non disponibile | non disponibile |
| Antociani totali bucce (g/kg) | | | |
| Flavonoidi totali bucce (g/kg) | | | |
| Flavonoidi totali vinaccioli (g/kg) | | | |
| pH (pH) | | | |
| Polifenoli totali (g/kg) | | | |
| Polifenoli totali bucce (g/kg) | | | |
| Polifenoli totali vinaccioli (g/kg) | | | |
| Tenore in zucchero del mosto (°Brix) | 22.200 | | |

Polifenoli uve

nessun descrittore polifenolico presente per Famoso

Aromi uve

nessun descrittore aromatico presente per Famoso

Altri descr.

nessun "altro" descrittore disponibile per Famoso

Accessioni della medesima varietà (1)

- Famoso - Dipartimento di Scienze Agrarie - Università degli Studi di Bologna

Note

Numerose sono le evidenze bibliografiche che testimoniano la presenza di un vitigno denominato Famoso in Romagna, coltivato in particolare nel cesenate (Pasqui, 1877; De Bosis, 1876; Pasqualini, 1886). In queste pubblicazioni viene rimarcato che il "Famoso" di Cesena è diverso da quello noto con lo stesso nome nella zona di Pesaro, ma non viene fornita una descrizione sufficientemente dettagliata. Bazzocchi nel 1923 cita il Famoso come "vitigno Cesenate di pregio discreto ma pochissimo coltivato". Attualmente è coltivato su una certa superficie nelle zone di Forlì, Bertinoro e Castrocaro, nelle colline intorno a Cesena, Brisighella e Riolo e molti viticoltori sono interessati alla realizzazione di nuovi impianti con tale vitigno. Sulla base di esperienze di vinificazione condotte anche da alcune cantine locali, il Famoso si è rivelato in grado di produrre vini di diversa tipologia, dal fermo al frizzante, caratterizzati da notevole intensità e aromi.