



Barbera ciarìa

Schneider A., Ruffa P., Raimondi S., 2019. Barbera ciarìa. In: Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

release 19/02/2020, ultimo aggiorn. 02/04/2020 url <http://vitisdb.it/varieties/show/1651>

Informazioni generali gestite da

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Ringraziamenti

Regione Piemonte

Informazioni botaniche

nome Barbera ciarìa
tipo di origine spontanea
specie non disponibile
gruppo di varietà Neutre
trueness to type informazione non inserita
codice IVD-var_481

genere non disponibile
sottospecie non disponibile
vitigno da

True-name

confermato **si**

Registrazione

iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti **no**

Sinonimi

sinonimi accertati (1)
 sinonimi accertati dall'Istituzione che compare con eventuale supporto bibliografico
 Ciarìa(Roero (Piemonte))

Accessione principale

accessione principale Barbera ciarìa
componente che l'ha inserita Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Accessioni standardizzate (1)

- Barbera ciarìa - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Tutte le accessioni (1)

- Barbera ciarìa - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Cloni omologati

Nessun clone disponibile per

Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti (9)																	
locus SSR:	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	135	155	225	227	247	247	185	189	196	200	251	259	242	256	239	267	241	273

Immagini



germoglio



foglia



grappolo

Riferimenti storici

Il primo e unico riferimento storico per questo vitigno è relativamente recente (Sannino, 1926). Trattandosi di una breve monografia comparsa sulla Rivista di Ampelografia, la descrizione che se ne riporta e i luoghi di coltura (Sommariva Perno nel Roero) sono ben coerenti con il vitigno qui presentato. La Barbera Ciarìa ha ben pochi caratteri in comune con il Barbera, mentre il suffisso Ciarìa viene dal nome di una famiglia di viticoltori che hanno diffuso la varietà localmente.

Diffusione & variabilità

Recuperata a Sommariva Perno, nel Roero, non pare che la coltura della Barbera Ciaria si sia espansa nemmeno nel passato, considerando che non viene citata negli accurati elenchi dei vitigni della provincia di Cuneo riportati nei Bollettini ampelografici di fine '800. Oggi non è più coltivata, se non da qualche amatore.

Utilizzazione tecnologica

Un tempo molta della produzione era smerciata come uva da tavola, vista la vocazione del Roero per i frutti da mensa. In particolare dall'area di coltura della Barbera ciaria provenivano uve nere da consumo fresco. Veniva anche vinificata, generalmente in blend con altre uve da vino locali. La coltura di questo vitigno è oggi pressoché scomparsa, né alcuno ha provato a farne del vino varietale.

Ampelografia

OIV	descrizione	valore		immagini
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice	8	tra elevata e molto elevata	
007	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi	1	verde	
008	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi	1	verde	
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno	
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	2	giallo	
053	Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)	7	elevata	
067	Foglia adulta: forma del lembo	2 / 4	cuneiforme / orbicolare	
068	Foglia adulta: numero dei lobi	1	uno (foglia intera)	
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	1	assente	
075	Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo	5	media	
076	Foglia adulta: forma dei denti	2	entrambi i lati rettilinei	
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	3	aperto	
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	1 / 2	a U / a parentesi graffa (f)	
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	1	assenti	
081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1	non delimitata	
083-2	Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori	1	assenti	
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	4	medio-bassa	
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	4	medio-bassa	
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato	
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	6	medio-lungo	
204	Grappolo: compattezza	6	medio-compacto	
208	Grappolo: forma	2	conico	
220	Acino: lunghezza	4 / 5	medio-corto / medio	
221	Acino: larghezza	4 / 5	medio-stretto / medio	
223	Acino: forma	2	sferoidale	
225	Acino: colore della buccia	6	blu nero	
231	Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa	1	nulla o molto debole	
236	Acino: particolarità dell'aroma	1	nessuna	
241	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo	

Ampelometria

OIV

nessun descrittore presente per Barbera ciaria

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Barbera ciaria

Bibliografia (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Sannino A.	1926	Note ampelografiche. Barbera "Ciaria".		Rivista di ampelografia, anno VII, n. 12, 179-180.
